

上部消化管検査判定結果

判定	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	異常なし	男 14,161 (87.0%)	女 8,348 (87.6%)	10	580	2,829	4,469	4,091	1,954
放置可	男 941 (5.8%)	女 482 (5.1%)	0	2	109	286	353	160	31
要経過観察	男 546 (3.4%)	女 390 (4.1%)	0	6	54	137	227	104	18
要精密検査	男 546 (3.4%)	女 291 (3.1%)	0	4	49	161	178	125	29
要治療	男 19 (0.1%)	女 3 (0.0%)	0	0	3	2	11	3	0
治療中	男 55 (0.3%)	女 16 (0.2%)	0	1	3	6	21	17	7
合計	男 16,268	女 9,530	10	593	3,047	5,061	4,881	2,363	313
	計 25,798	計 25,798	13	831	4,723	8,226	7,902	3,600	503

胃内視鏡検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	食道裂孔ヘルニア	男 275 (30.6%)	女 49 (11.9%)	0	1	44	82	114	32
逆流性食道炎	男 195 (21.7%)	女 18 (4.4%)	0	1	29	68	71	22	4
粘膜下腫瘍	男 3 (0.3%)	女 1 (0.2%)	0	0	0	1	2	0	0
ポリープ	男 4 (0.4%)	女 0 (0.0%)	0	0	1	1	2	0	0
その他の所見	男 40 (4.4%)	女 16 (3.9%)	0	0	5	7	21	6	1
慢性胃炎	男 464 (51.6%)	女 188 (45.6%)	0	1	35	141	200	76	11
萎縮性胃炎	男 63 (7.0%)	女 22 (5.3%)	0	0	6	14	32	10	1
出血性胃炎	男 1 (0.1%)	女 0 (0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
びらん性胃炎	男 41 (4.6%)	女 15 (3.6%)	0	0	3	13	20	4	1
タコイボびらん	男 1 (0.1%)	女 1 (0.2%)	0	0	1	1	0	0	0
胃潰瘍	男 5 (0.6%)	女 2 (0.5%)	0	0	0	2	3	0	0
胃潰瘍瘢痕	男 11 (1.2%)	女 1 (0.2%)	0	0	0	2	4	3	2
ポリープ	男 152 (16.9%)	女 128 (31.1%)	0	0	19	38	70	23	2
粘膜下腫瘍	男 12 (1.3%)	女 8 (1.9%)	0	0	1	2	8	0	1
その他の所見	男 95 (10.6%)	女 32 (7.8%)	0	0	9	29	40	12	5
十二指腸潰瘍	男 5 (0.6%)	女 3 (0.7%)	0	0	0	0	4	1	0
十二指腸潰瘍瘢痕	男 42 (4.7%)	女 13 (3.2%)	0	0	3	13	14	10	2
慢性十二指腸炎	男 33 (3.7%)	女 2 (0.5%)	0	0	6	7	16	4	0
ポリープ	男 11 (1.2%)	女 1 (0.2%)	0	0	0	4	5	2	0
憩室	男 1 (0.1%)	女 1 (0.2%)	0	0	0	0	1	0	0
その他の所見	男 39 (4.3%)	女 7 (1.7%)	0	0	6	14	10	9	0
検診者総数	男 900	女 412	0	1	124	283	364	111	17
	計 1,312	計 1,312	0	2	190	434	523	144	19

胃部X線検査所見

所見	総数		19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
	食道部	男 1 (0.0%)	女 0 (0.0%)	0	0	0	0	0	1
拡張	男 0 (0.0%)	女 0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
狭窄	男 0 (0.0%)	女 1 (0.0%)	0	0	0	0	0	1	0
辺縁不整	男 4 (0.0%)	女 3 (0.0%)	0	0	0	1	1	2	0
粘膜不整	男 1 (0.0%)	女 0 (0.0%)	0	0	1	0	0	0	0
食道裂孔ヘルニア	男 13 (0.1%)	女 5 (0.1%)	0	0	1	1	5	1	5
食道炎の疑い	男 2 (0.0%)	女 0 (0.0%)	0	0	0	1	0	1	0
食道潰瘍の疑い	男 1 (0.0%)	女 0 (0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
隆起性病変の疑い	男 17 (0.1%)	女 16 (0.2%)	0	1	2	5	4	3	1
憩室の疑い	男 33 (0.2%)	女 23 (0.3%)	0	1	5	13	7	4	3
術後胃	男 22 (0.2%)	女 4 (0.0%)	0	0	0	1	5	5	2
その他の所見	男 37 (0.3%)	女 23 (0.3%)	0	1	3	6	11	13	3
胃部	男 18 (0.1%)	女 3 (0.0%)	0	0	0	7	6	4	1
伸展不良	男 7 (0.1%)	女 8 (0.1%)	0	0	1	2	1	3	0
辺縁不整	男 2 (0.0%)	女 1 (0.0%)	0	0	0	1	0	1	0
壁硬化	男 237 (1.9%)	女 22 (0.3%)	0	1	21	67	81	57	10
変形	男 6 (0.0%)	女 2 (0.0%)	0	0	0	1	1	3	1
粘膜不整	男 2 (0.0%)	女 8 (0.0%)	0	0	0	1	1	0	0
ニッシュ	男 3 (0.0%)	女 0 (0.0%)	0	0	1	1	1	0	0
レリーフ集中像	男 21 (0.2%)	女 3 (0.0%)	0	1	3	2	7	8	0
バリウム斑	男 6 (0.0%)	女 1 (0.0%)	0	0	1	3	1	1	0
十二指腸部	男 139 (1.1%)	女 27 (0.3%)	0	4	13	24	64	30	4
十二指腸球部変形	男 31 (0.3%)	女 2 (0.0%)	0	1	4	9	14	3	0
十二指腸潰瘍の疑い	男 35 (0.3%)	女 3 (0.0%)	0	0	5	10	11	7	2
十二指腸潰瘍瘢痕の疑い	男 7 (0.1%)	女 4 (0.0%)	0	0	0	2	3	2	0
隆起性病変の疑い	男 1 (0.0%)	女 1 (0.0%)	0	0	0	1	0	0	0
造影不良	男 6 (0.0%)	女 0 (0.0%)	0	0	0	1	5	0	0
十二指腸拡張不良	男 3 (0.0%)	女 0 (0.0%)	0	0	1	1	1	0	0
その他の所見	男 0 (0.0%)	女 1 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0
検診者総数	男 12,185	女 8,036	9	360	2,325	3,718	3,548	1,979	246
	計 20,221	計 20,221	12	574	3,691	6,315	6,124	3,109	396