

児童・生徒を対象とした健診

児童・生徒の腎臓健診受診者の尿所見

| 検査項目 | 性別 | 総数     |      |       |
|------|----|--------|------|-------|
|      |    | 受診者数   | 陽性者数 | 陽性率   |
| 尿糖   | 男  | 20,897 | 20   | 0.10% |
|      | 女  | 20,496 | 17   | 0.08% |
|      | 計  | 41,393 | 37   | 0.09% |
| 尿蛋白  | 男  | 20,897 | 271  | 1.30% |
|      | 女  | 20,496 | 163  | 0.80% |
|      | 計  | 41,393 | 434  | 1.05% |
| 尿潜血  | 男  | 20,897 | 150  | 0.72% |
|      | 女  | 20,496 | 529  | 2.58% |
|      | 計  | 41,393 | 679  | 1.64% |

児童・生徒の心臓検査所見 (経過観察者を除く)

| 判定     |              | 人数     |      |
|--------|--------------|--------|------|
| 心臓の異常  | 心房中隔欠損       | 5      | 0.0% |
|        | 心室中隔欠損       | 34     | 0.2% |
|        | 肺動脈狭窄        | 17     | 0.1% |
|        | 動脈管開存        | 6      | 0.0% |
|        | ファロー四徴       | 0      | 0.0% |
|        | 先天性心疾患(位置異常) | 0      | 0.0% |
|        | 先天性心疾患(その他)  | 17     | 0.1% |
|        | 大動脈弁疾患       | 2      | 0.0% |
|        | 僧帽弁疾患        | 10     | 0.1% |
|        | 三尖弁疾患        | 7      | 0.0% |
|        | 心筋症          | 0      | 0.0% |
|        | 虚血性心疾患       | 0      | 0.0% |
|        | 心臓手術後        | 79     | 0.5% |
|        | その他          | 21     | 0.1% |
| 計      | 198          | 1.3%   |      |
| その他の異常 | 胸郭変形         | 3      | 0.0% |
|        | 先天性心疾患の自然閉鎖  | 35     | 0.2% |
|        | 川崎病後         | 220    | 1.4% |
|        | 高血圧          | 0      | 0.0% |
|        | その他          | 30     | 0.2% |
| 計      | 288          | 1.8%   |      |
| 受診者数合計 |              | 15,632 |      |

| 判定         |                  | 人数   |      |
|------------|------------------|------|------|
| 心電図の異常     | 右室肥大             | 1    | 0.0% |
|            | 左室肥大             | 4    | 0.0% |
|            | 心筋障害             | 0    | 0.0% |
|            | 洞性頻脈             | 1    | 0.0% |
|            | 洞性徐脈             | 51   | 0.3% |
|            | 上室性期外収縮          | 28   | 0.2% |
|            | 心室性期外収縮          | 70   | 0.4% |
|            | 上室性・心室性期外収縮      | 1    | 0.0% |
|            | 第1度房室ブロック        | 23   | 0.1% |
|            | 第2度房室ブロック        | 11   | 0.1% |
|            | 房室解離             | 0    | 0.0% |
|            | 完全右脚ブロック         | 21   | 0.1% |
|            | 不完全右脚ブロック        | 103  | 0.7% |
|            | ヘミブロック           | 0    | 0.0% |
|            | 刺激発生異常           | 234  | 1.5% |
|            | W P W 症候群        | 18   | 0.1% |
|            | P Q 短縮・L G L 症候群 | 1    | 0.0% |
| Q T 延長症候群  | 3                | 0.0% |      |
| その他        | 36               | 0.2% |      |
| 計          | 606              | 3.9% |      |
| X線検査の異常心拡大 |                  | 1    | 0.0% |

児童・生徒のすこやか検診(血液検査)結果

|           | 性別 | 肥満            |               | 血清・脂質        |              |             | 肝機能         |             | 貧血          |             |             | 白血球        |            | 血小板   |
|-----------|----|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------|
|           |    | 肥満度           | 総コレステロール      | 中性脂肪         | HDLコレステロール   | 動脈硬化指数      | G P T       | 赤血球数        | ヘモグロビン      | ヘマトクリット     | 白血球数        |            | 血小板数       |       |
|           |    |               |               |              |              |             |             |             |             |             | 4.3未満       | 15.1以上     |            |       |
| 対象者       | 男  | 2,288         | 2,288         | 2,288        | 2,288        | 2,288       | 2,288       | 2,288       | 2,288       | 2,288       | 2,288       | 2,288      | 2,288      | 2,288 |
|           | 女  | 2,108         | 2,108         | 2,108        | 2,108        | 2,108       | 2,108       | 2,108       | 2,108       | 2,108       | 2,108       | 2,108      | 2,108      | 2,108 |
|           | 計  | 4,396         | 4,396         | 4,396        | 4,396        | 4,396       | 4,396       | 4,396       | 4,396       | 4,396       | 4,396       | 4,396      | 4,396      | 4,396 |
| 受診者       | 男  | 1,873         | 1,873         | 1,873        | 1,873        | 1,873       | 1,873       | 1,872       | 1,872       | 1,872       | 1,872       | 1,872      | 1,872      | 1,872 |
|           | 女  | 1,783         | 1,783         | 1,783        | 1,783        | 1,783       | 1,783       | 1,782       | 1,782       | 1,782       | 1,782       | 1,782      | 1,782      | 1,782 |
|           | 計  | 3,656         | 3,656         | 3,656        | 3,656        | 3,656       | 3,656       | 3,654       | 3,654       | 3,654       | 3,654       | 3,654      | 3,654      | 3,654 |
| 要経観察者数(%) | 男  | 193<br>(10.3) | 239<br>(12.8) | 47<br>(2.5)  | 92<br>(4.9)  | -           | 50<br>(2.7) | 10<br>(0.5) | 50<br>(2.7) | 23<br>(1.2) | -           | -          | -          |       |
|           | 女  | 142<br>(8.0)  | 231<br>(13.0) | 53<br>(3.0)  | 84<br>(4.7)  | -           | 5<br>(0.3)  | 13<br>(0.7) | 39<br>(2.2) | 14<br>(0.8) | -           | -          | -          |       |
|           | 計  | 335<br>(9.2)  | 470<br>(12.9) | 100<br>(2.7) | 176<br>(4.8) | -           | 55<br>(1.5) | 23<br>(0.6) | 89<br>(2.4) | 37<br>(1.0) | -           | -          | -          |       |
| 要精密検査数(%) | 男  | 65<br>(3.5)   | 43<br>(2.3)   | 26<br>(1.4)  | 0<br>(0.0)   | 23<br>(1.2) | 50<br>(2.7) | 1<br>(0.1)  | 1<br>(0.1)  | 9<br>(0.5)  | 13<br>(0.7) | 3<br>(0.2) | 1<br>(0.1) |       |
|           | 女  | 34<br>(1.9)   | 34<br>(1.9)   | 15<br>(0.8)  | 0<br>(0.0)   | 16<br>(0.9) | 8<br>(0.4)  | 0<br>(0.0)  | 6<br>(0.3)  | 7<br>(0.4)  | 13<br>(0.7) | 5<br>(0.3) | 3<br>(0.2) |       |
|           | 計  | 99<br>(2.7)   | 77<br>(2.1)   | 41<br>(1.1)  | 0<br>(0.0)   | 39<br>(1.1) | 58<br>(1.6) | 1<br>(0.0)  | 7<br>(0.2)  | 16<br>(0.4) | 26<br>(0.7) | 8<br>(0.2) | 4<br>(0.1) |       |